



## Kostenübernahme durch Krankenversicherungsträger bei Durchführung der HPV-Untersuchung in Form einer Reflextestung mittels HPV und LBC

- Zuweisung aus dem niedergelassenen Bereich
- und**
- durch Fachärztinnen und Fachärzte für Frauenheilkunde und Geburtshilfe
- und**
- der Zuweisungsschein ist sowohl mit dem „Barcode Patientin“ (Versicherungsnummer), als auch mit dem „Barcode Ordination“ (VPN-Nummer der niedergelassenen Fachärztin/des niedergelassenen Facharztes) zu versehen – Andruck mittels Praxissoftware;
  - und aus dem Zuweisungsschein muss klar hervorgehen:
    - ob eine Reflextestung mittels HPV und LBC *oder* eine konventionelle Zytologie durchgeführt werden soll sowie
    - ob es eine Anforderung auf „Kassenleistung“ *oder* „Selbstzahlerleistung“ ist;
    - der Krankenversicherungsträger

### bei folgenden Screening-Ergebnissen des PAP-Abstrichs

#### PAP lt. ÖGZ 2017 /

#### Bethesda 2014

#### Empfehlung

#### PAP III / ASC-US

Aufgrund dieses zytologischen Befundes wird eine Dünnschichtzytologie mit HPV-Test und Kolposkopie innerhalb von 3 Monaten empfohlen.

**oder** Ist der HPV-Test positiv, so wird eine PE/ECC angeraten.

#### PAP III / ASC-H

In erster Linie wird eine Kolposkopie und Histologie (Biopsie/ECC) angeraten.

Bei einer negativen Histologie wird eine Dünnschichtzytologie mit HPV-Test nach 3 Monaten empfohlen.

#### **oder** PAP III G / AGC

Aufgrund dieses zytologischen Befundes wird eine Dünnschichtzytologie mit HPV-Test, Kolposkopie und evtl. eine Biopsie/ECC und Vaginalsonographie innerhalb von 3 Monaten empfohlen.

#### **oder** PAP IV / HSIL

In erster Linie wird eine Kolposkopie und Histologie (Biopsie/ECC) angeraten.

Bei einer negativen Histologie wird eine Dünnschicht-Zytologie mit HPV-Test nach 3 Monaten empfohlen.

#### **oder** fehlende EZ/TZ

Sind Zellen der Transformationszone nicht vorhanden und ist die Patientin > 30 Jahre alt, wird eine Dünnschichtzytologie und HPV-Testung innerhalb von 6–12 Monaten empfohlen.

#### **oder** Zustand nach Konisation

Es wird empfohlen frühestens 6 Monate nach der Therapie eine Dünnschichtzytologie mit HPV-Testung durchzuführen.